

Konsensus izveštaj eksperata Centralne i Istočne Evrope o adherenciji na dvojni antitrombocitnu terapiju (DAPT) posle akutnog koronarnog sindroma (AKS)

Prof. dr Petr Widimský, FESC, FACC

Cardiocentar, Charles Univerzitet Prag i Univerzitetska bolnica Kralovske Vinohrady, Češka Republika

Prof. dr Jasek Legutko, PhD

Jagiellonian Univerzitet Medicinski Koledž Krakov, Poljska

Prof. dr Dan Gaita, PhD, FESC

“Victor Babeş” Univerzitet za Medicinu i Farmaciju Temišvar, Rumunija

Prof. dr Aleksandar N. Nešković, FESC, FACC

Univerzitetski kliničko-bolnički centar Zemun, Beograd, Srbija

Prof. dr Slobodan Obradović, PhD

Vojnomedicinska Akademija, Beograd, Srbija

Doc. dr Mariya Tokmakova. PhD

Univerzitetska bolnica “St. Georgi”, Medicinski Univerzitet Plovdiv, Bugarska

Doc. dr Joško Bulum, PhD

Univerzitetski bolnički centar Zagreb, Hrvatska

Dr Vjekoslav Tomulić, PhD

Univerzitetski bolnički centar Rijeka, Hrvatska

Prosečna stopa smrtnosti od ishemijske bolesti srca u zemljama Centralne i Istočne Evrope iznosi oko 17%. Među pacijentima koji prežive akutni infarkt miokarda (AIM), 20% doživi drugi kardiovaskularni događaj tokom prve godine. Sekundarna prevencija uključuje intervencije zasnovane na dokazima, kao što su optimalni medicinski tretman, odgovarajuće promene načina života i kontrolu kardiovaskularnih faktora rizika. Adherencija na preporuke u vezi sa lečenjem AKS ključna je za povoljne ishode. Rani prekid dvojne antitrombocitne terapije (DAPT) povećava rizik od trombotičnih komplikacija, infarkta miokarda i smrti. Raspoloživi podaci o adherencijij na DAPT pokazuju da se stope prekidanja terapije perzistentno povećavaju tokom vremena, od početka terapije do 12 meseci posle primarnog događaja. Adherencija na propisanu terapiju je složeno zdravstveno ponašanje na koje utiču brojni faktori od onih koji pružaju zdravstvene usluge (lekari i stručna udruženja), pacijenata i zdravstvenog sistema. Ovaj konsensus izveštaj grupe eksperata iz Centralne i Istočne Evrope daje preporuke interevencija koje mogu poboljšati adherenciju na DAPT.

Key words: akutni koronarni sindrom, dvojna antitrombocitna terapija, tikagrelor, adherencija